



Министерство здравоохранения Свердловской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Свердловский областной медицинский колледж»

Справочное пособие


**Методическая таблица по выписке, учету, хранению
и отпуску лекарственных препаратов и иных
веществ, подлежащих различным видам контроля**

дисциплина Фармакология

Одобрено
на областном методическом объединении
медико-биологических дисциплин

Протокол № 2 от 06.04.2018г.
/Никитина Г.А./

Согласовано на заседании ЦМС
Протокол № 9 от «11» 04 2018г

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора по НМР
 /О.В. Ледянкина/



Составлен в соответствии с ФГОС СПО
по специальностям:
31.02.01.Лечебное дело СПО углубленной
подготовки очная форма обучения
34.02.01 Сестринское дело СПО базовой
подготовки очная форма обучения
34.02.01 Сестринское дело СПО базовой
подготовки очно-заочная форма обучения
31.02.02 Акушерское дело СПО базовой
подготовки очная форма обучения

Методическая таблица по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля рекомендована для студентов медицинских вузов, колледжей и специалистов практического здравоохранения, которые могут осуществлять назначение и выписывание лекарственных препаратов.

Составители: Шишкина Юлия Борисовна, главный специалист отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области.

Кузьмина Галина Викторовна, преподаватель фармакологии высшей квалификационной категории ГБПОУ "СОМК"

Пояснительная записка

Согласно приказа МЗ РФ от 20.12.2012г № 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (ред. от 21.04.2016 № 254н) назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется *лечащим врачом, фельдшером, акушеркой* в случае возложения на них полномочий лечащего врача в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н "Об утверждении Порядка возложения *на фельдшера, акушерку* руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по *назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты*"

Методическая таблица по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля содержит:

1. Международное непатентованное наименование (МНН) лекарственных средств в алфавитном порядке, торговые названия (ТН).
2. Зарегистрированные лекарственные формы.
3. Образец выписки рецепта.
4. Основания для применения мер контроля.
5. Подлежит лекарственное средство предметно-количественному учету.
6. Правила хранения: подлежит хранению в укрепленном и оснащем ОПС помещении.
7. Форма рецептурного бланка .
8. Предельная норма отпуска лекарственного средства на 1 рецепт.
9. Примечания: фармако-терапевтическая группа (ФТГ), код анатомо-терапевтическая-химическая классификация (АТХ), сроки хранения рецептов в аптечной организации .

Методическая таблица по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля составлена на основании документов:

1. Приказ МЗ РФ от 20.12.2012г № 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (ред. от 21.04.2016 № 254н)

2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 "О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"

3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного Кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного Кодекса РФ"

4. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ"

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 № 157н "Об утверждении предельно допустимого количества наркотического средства, психотропного вещества и их прекурсора, содержащегося в препаратах"

6. Приказ Минздрава России от 17.05.2012 № 562н " Об утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества"

7. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету"

8. Приказ Минздрава России от 11.07.2017 № 403н. " Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность"

9. Постановление Правительства РФ от 9.06.2010 № 419"Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ "

Методическая таблица по выписке, учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих различным видам контроля

МНН (ТН)	зарегистрированные лекарственные формы	образец выписки рецепта	основания для применения мер контроля	подлежит предметно-количественному учету	подлежит хранению в укрепленном и оснащении ОПС	форма рецептурного бланка	предельная норма отпуска на 1 рецепт	примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Алпразолам (Алзолам, Золомакс, Неурол, Хелекс, Хелекс СР)	таблетки по 0,25 мг таблетки по 1 мг	Рр: Tabl. Alprazolami 0, 25 mg D.t.d. №50 *S. Внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в сутки, независимо от приема пищи.	ПВ Списка III	+	х	148-1/у-88	-	ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Агомелатин (Вальдоксан)	таблетки по 25 мг	Рр: Tabl. Agomelatini 25 mg D.t.d. № 98 *S. По 1 табл. однократно перед сном	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX22 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Азенапин (Сафрис)	таблетки подъязычные 10 мг	Рр: Tabl. Azenapini 10 mg D.t.d. №100 *S. Под язык 1 таблетка 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Нейролептики код АТХ N05AH05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аминофенилмасляная кислота (Анвифен, Ноофен, Фенибут)	капсулы по 25 мг капсулы по 250 мг	Rp:Acidi Aminophenybutyrici 250mg D.t.d. №100 in capsulis *S По 1таб. 3 раза в день курсами по 2-3 недели	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Ноотропы Анксиолитики код АТХ N05BX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Амисульприд (Лимипранил, Солиан)	таблетки по 100 мг таблетки по 400 мг раствор для приема внутри 100 мг/мл, флаконы	Rp:Sol. Amisulpridi 100 mg/ml-60 ml D. *S Rp: Tabl. Amisulpridi 400 mg D.t.d. №30 *S По 1 таблетке 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Нейролептики код АТХ N05AL05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Амитриптилин (Амитриптилин, Сароген Ретард)	таблетки по 10 мг таблетки по 25 мг капсулы продолжительного действия по 50 мг	Rp: Tabl. Amitriptylini 10 mg D.t.d. №50 *S. Внутри 1 таблетка 2раза в сутки во время или после еды Rp.: Sol.Amitriptylini 1% – 2 ml	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AA09 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Арипипразол (Абилифай, Алембик Пипзол, Амдоал, Арипипразол ОД-Тева, АРИПИЗОЛ, Зилаксер)	таблетки по 10 мг таблетки по 15 мг таблетки по 30 мг таблетки диспергируемые в полости рта по 30 мг	Rp: Tabl. Aripiprazoli 10 mg D.t.d. №50 * S.Внутри 1 таб. 1 раз в сутки независимо от приема пищи	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Нейролептики код АТХ N05AX12 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ангидрид уксусной кислоты (в концентрации 10% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		химический реактив, отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров
Ацетон (в концентрации 60% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		химический реактив, отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
Бензобарбитал (Бензонал)	таблетки по 50 мг таблетки по 100 мг	Rp: Tabl. Benzobarbitali 100 mg D.t.d.. №50 *S. Внутрь по 1 таб. 3 раза в сутки, после еды.	СВ	+		148-1/у-88	1 упаковка таблеток по 50 мг или 100 мг ¹	ФП Противозпадегические средства рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
1,4-бутандиол (в концентрации 15% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		отнесен к таблице II Списка IV прекурсоров
Бромдигидрохлор фенилбензодиазепин (Феназеф, Фезинам, Феназепам, Фензипат, Фенорелаксан, Транквиазипам, Элзепам)	таблетки по 0,5 мг таблетки по 1 мг таблетки по 2,5 мг 0,1 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp: Tabl. Bromdihydrochlorophenylbenzodiazepini 1 mg D.t.d.. №50 *S. Внутрь 1 таб. за 20-30 мин до сна. Rp.: Sol. Bromdihydrochlorophenylbenzodiazepini 0,1% - 1 ml D.t.d. №10 in amp. *S В/м п 1мл 1 раз в день.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФП Анксиолитики код АТХ N05BX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бупренорфин (Бупранал, Бупренорфина гидрохлорид, Транстек)	0,03 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций трансдермальная терапевтическая система (ТТС) в дозировках по 35 мкг/час, 52,5 мкг/час, 70 мкг/час	Рр.: Sol. Buprenorphini 0,03% – 2 ml D.t.d. №30 (придавать) in apr. *S. В мышцу 2 мл при болевом синдроме Рр.: Buprenorphini TTS 70 mg/kg/h D.t.d. 5 (пять) *S. Трансдермальная терапевтическая система накладывается на 72 ч.	НС	+	х	специальный рецептурный бланк 107/у-НП	30 ампул (шприц-тюбиков); 20 пласт. - 35 мкг/ч; 10 пласт. - 52,5 мкг/ч; 5 пласт. - 70 мкг/ч ²	ФТГ Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Бупренорфин мг, Налоксон 0,2 мг (Бупраксон)	0,2 таблетки подязычные	Рр.: Tabl. Buprenorphini 0,2 mg Naloxoni 0,2 mg D.t.d. №20 (двадцать) *S. По 1–2 табл. под язык (не разжевывая, не глотая) каждые 6–8 ч.	НС	+	х	148-1/у-88	60 таблеток (упаковка, кратная № 20) ²	ФТГ Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Бупирон (Спитомин)	таблетки по 5 мг таблетки по 10 мг	Рр.: Tabl. Busipironi 5 mg D.t.d. №20 *S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵	ФТГ Дофаминомиметики, Анксиолитики код АТХ N05BE01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца	
Буторфанол (Буторфанола тартрат, Веро-Буторфанол, Стадол)	0,2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Рр.: Sol. Butorphanoli 0,2% – 1 ml D.t.d. №20 (двадцать) in apr. *S. В/м 1 мл. однократно	ЛВ Спекта III	+	х	148-1/у-88	20 ампул 0,2% раствора по 1 мл ²	Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Венлафаксин (Алвента, Велаксин, Велафакс, Велафакс МВ, Венлаксор, Воксемель, Ньювелонг, Эфвелон, Эфвелон ретард)	таблетки по 25 мг таблетки по 37,5 мг таблетки по 75 мг капсулы пролонгированного действия по 37,5 мг, по 75 мг, по 150 мг таблетки пролонгированного действия по 150 мг	Rp.: Venlafaxini 75mg. D.t.d.: № 28 in capsulis *S. Принимать по 1 капсуле в сутки в одно и то же время.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX16 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Вортиоксетин (Бринтелликс)	таблетки по 15 мг	Rp.: Tabl. Vortioxetini 15 mg D.t.d.№28 *S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX26 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Галоперидол (Сенорм)	таблетки по 1,5 мг таблетки по 2 мг таблетки по 5 мг 0,2 % раствор, капли для приема внутрь 0,5% раствор в ампулах по 1 мл или 2 мл для инъекций 5 % масляный раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp: Tabl. Haloperidoli 1,5 mg D.t.d. №50 *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день за полчаса до еды. Rp.:Sol.Haloperidoli 0,2%- 30 ml D.*S. Rp.:Sol.Haloperidoli oleosae 5%- 1ml D.t.d. №10 in amp. *S. В/м 1 мл.2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AD01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Гексобарбитал (Гексенал)	лиофизат для приготовления раствора для в/в введения по 1,0 г	стационарный ЛП, используется для наркоза	СВ	+		-		используется для наркоза, по рецептам не отпускается
Гестрион (Неместран)	капсулы по 2,5 мг	Rp.: Hestrinoni 2,5 mg D.t.d. №8 in capsulis S. Внутрь по 1 капсуле по схеме.	СВ	+		148-1/y-88		ФТГ Гестаген рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Гидроксизин (Атаракс)	таблетки по 25 мг 5 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Hydroxyzini 25 mg D.t.d. №30 *S. Внутрь 1 таб. 1 раз в сутки Rp.:Sol. Hydroxyzini 5%-2 ml D.t.d. №5 in amp. *S В/м по 1мл.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) код АТХ N05BV01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Даназол (Данол)	капсулы по 100 мг капсулы по 200 мг	Rp.: Danazoli 0,2 D.t.d. № 60 in capsulis *S. Внутрь по 1 капсуле 2 раз в сутки	СВ	+		148-1/y-88		ФТГ Гонадотропных гормонов секрции ингибитор рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Дулоксетин (Дулоксента, Симбалта)	капсулы по 30 мг	Rp: Duloxetine 30 mg D.t.d. №30 in capsulis *S: Внутрь по 1 капсуле в день	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AX21 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Диазепам (Апаурин, Реланиум, Релиум, Седуксен, Сибазон)</p>	<p>таблетки по 5 мг 0,5 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций</p>	<p>Rp.: Tabl. Diazepamі 5 mg D.t.d. №30 *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день Rp.: Sol. Diazepamі 0,5%- 2 ml D.t.d. №5 in amp. *S. В/м 1 мл. 2 раза всутки</p>	<p>ЛВ Списка III</p>	+	х	148-1/у-88	-	<p>ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет</p>
<p>Диазепам 10 мг, циклобарбитал 100 мг (Реладорм)</p>	<p>таблетки</p>	<p>Rp.: Diazepamі 10mg. Ciclobarbitali 100mg. D.t.d. № 10 in tabl. *S. По 1табл. перед сном</p>	<p>ЛВ Списка III</p>	+	х	148-1/у-88	-	<p>ФТГ Снотворные средства в комбинациях рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет</p>
<p>Дигидрокодеин (ДГК Континус)</p>	<p>таблетки пролонгированного действия по 60 мг, 90 мг, 120 мг</p>	<p>Rp.: Dihydrocodeini 60 mg D.t.d. №40 (сорок) in tabl. prolonga *S. Внутрь по 1 таблетке каждые 12 часов</p>	<p>НС</p>	+	х	специал ьный рецепту рный бланк 107/у- НП	<p>40 таблеток по 60мг; 30 таблеток по 90 мг, 20 таблеток по 120 мг²</p>	<p>ФТГ Анальгезирующее наркотическое средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет</p>
<p>декстрометорфана гидробромид 0,02 г (20 мг), парацетамол 0,65 г (650 мг), хлорфенамин 0,04 г (40 мг), аскорбиновая кислота 0,25 г (250 мг), кофеин 0,03 г (30 мг) (Инфлблок)</p>	<p>порошок шипучий для приготовления раствора для приема внутрь</p>	<p>Rp.: Dextromethorfanis hydrobromidi 0,02 Paracetamoli 0,65 Chlorphenamini 0,04 Acidi ascorbinici 0,25 Coffeini 0,03 D.t.d. №10 *S. Внутрь 1 пакетик 3 раза в сутки каждые 8 часов, предварительно растворить содержимое пакетика в ½ стакана горячей воды</p>	<p>комбиниров анный ЛП</p>			107-1/у ⁵		<p>ФТГ Парацетамол в комбинации с психолептиками содержит ЛВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "д" п. 4 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012 № 562Н</p>

1	дектрометорфан а гидробромид 0,015 г (15 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг), хлорфенирамина малеат 0,002 г (2 мг), фенилэфрина гидрохлорид 0,01 (10 мг) (Тофф плюс)	2	капсулы	3	4	5	6	7	8	9
				Rр.: Dextromethorfanis hydrobromidi 0,015 Paracetamoli 0,5 Chlorpheniraminis maleati 0,002 Phenylephrini hydrochloridi 0,01 D.t.d. №10 in capsulis *S. Внутрь по 1 капсуле каждые 4-6 часов	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		Парацетамол в комбинации с психолептиками содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "д" п. 4 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562Н
				Rр.: Dextromethorfanis hydrobromidi 0,015 Paracetamoli 0,5 Pseudoephedrinis hydrochloridi 0,03 Acidi ascorbinici 0,062 D.t.d. №10 in tabl. *S. Внутрь по 1 таблетке 4 раза в день	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		ФТГ ОРЗ и "простуды" симптомов средство устранения содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "г" п. 4 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562Н
				без рецепта	комбинированный ЛП			отпускается без рецепта врача ³		содержит ПВ Списка III в малом количестве,
				дектрометорфана гидробромид 0,015 г (15 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг), псевдоэфедрина гидрохлорид 0,03 г (30 мг), аскорбиновая кислота 0,062 г (62 мг) (Каффетин Колд)	таблетки					
				дектрометорфан а гидробромид 0,0075 г (7,5 мг), парацетамол 0,3 г (300 мг) (Инфлюнет ЭЙР Стоп Тос, Падевикс)	таблетки шипучие					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>на 100 мл сиропа: дексстрометорфан а гидробромид 0,2 г (200 мг), терпингидрат 0,2 г (200 мг), левоментол 0,075 г (75 мг) (Гликодин)</p>	<p>сироп</p>	<p>Rp.:Dextromethorfan hydrobromidi 0,2 Terpingidrat 0,2 Levoментол 0,075 Sacchari syuguri 100 ml *S. Внутрь 1 чайная ложка 3 раза в день</p>	<p>комбинированный ЛП</p>	<p>+</p>		<p>148-1/у-88</p>	<p>-</p>	<p>ФТ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "г" п. 5 приказа Минздравасопразвития России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>на 100 мл сиропа: дексстрометорфан а гидробромид 0,075 г (75 мг), парацетамол 5 г, промстазина гидрохлорид 0,1 г (100 мг) (Колдрекс Найт)</p>	<p>сироп</p>	<p>Rp.:Dextromethorfan hydrobromidi 0,075 Paracetamol 5,0 Prometazini hydrochloridi 0,1 Sacchari syuguri 100 ml *S.Внутрь по 4 чайные ложки на ночь</p>	<p>комбинированный ЛП</p>	<p>+</p>		<p>148-1/у-88</p>	<p>-</p>	<p>ФТ ОРЗ и "простуды" симптомов средство устранения (анальгезирующее ненаркотическое средство+противокашлевое опиоидное средство+Н1-гистаминовых рецепторов блокатор) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "г" п. 5 приказа Минздравасопразвития России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>на 100 мл сиропа: дексстрометорфан гидробромид моногидрат 0,2 г (200 мг), фенилэфрин гидрохлорид 0,1 г (100 мг), хлорфенамин малсат 0,04 г (40 мг) (Терасил-Д)</p>	<p>сироп</p>	<p>Rp.:Dextromethorfan hydrobromidi monogidrat 0,015 Phenilephri hydrochloridi 0,1 Chlorpheniramin maleati 0,04 Sacchari syuguri 100 ml D* S. Внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в сутки, запивая небольшим</p>	<p>комбинированный ЛП</p>	<p>+</p>		<p>148-1/у-88</p>	<p>-</p>	<p>ФТ Противокашлевое средство комбинированное рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "г" п. 5 приказа Минздравасопразвития России от 17.05.2012 № 562н</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
на 100 мл сиропа: дексстрометорфан а гидробромида 0,2 г (200 мг), гвайфенезина 2 г (Туссин плюс)	сироп	Rp.: Dextromethorfan hydrobromidi 0,2 Guaifenesini 2,0 Sacchari syngiri 100 ml D* S. Внутрь по 2 чайной ложке каждые 4 часа после еды	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	-	ФТГ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Залепон (Анданте)	капсулы по 5 мг	Rp.: Zaleploni 5 mg D.t.d. №14 in capsulis *S. Внутрь перед сном по 1 капсуле	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Снотворное средство код АТХ N05CF03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Зипрасидон (Зелдокс, Зипсила)	капсулы по 20 мг капсулы по 80 мг лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения флаконы по 30 мг	Rp.: Ziprasidoni 0,02 D.t.d. №56 in capsulis *S. Внутрь во время еды по 1 капсуле 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AE04 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Змеиный яд (за исключением лекарственных форм наружного применения - мази, гели)	в чистом виде не применяется		яв	+		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Золпидем (Гипноген, Ивадал, Зольсана, Ивадал, Нитрест, Онириа, Санвал, Сновител)	таблетки по 10 мг	Rp.: Zolpidemi 10 mg D.t.d. № 30 in tabl. *S. Внутрь по ½ таблетке за час до сна.	ПВ Сильска III	+	x	148-1/у-88	-	ФТГ Снотворное средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Зопиклон (Имован, Пиклодорм, Релаксон, Сомнол, Торсон)	таблетки по 7,5 мг	Rp.: Zopicloni 7,5 mg D.t.d № 10 in tabl. *S. По 1 таблетке перед сном	СВ	+		148-1/у-88	-	ФТГ Снотворное средство рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Зуклопентиксол (Клопиксол акуфаз, Клопиксол децо, Клопиксол)	таблетки по 2 мг таблетки по 10 мг 5 % масляный раствор в ампулах по 1 мл или по 2 мл для инъекций 20 % масляный раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 50 % масляный раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Zuclopernthixoli 0,002 D.t.d. №50 *S. Внутрь по 1 таблетке в сутки Rp.: Sol. Zuclopernthixoli oleosae 5%-1 ml D.t.d. №10 in amp. *S. В мышцу 1 мл каждые 2 недели				107-1/у ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AF05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Имипрамин (Мелипрамин)	таблетки по 25 мг драже по 25 мг 1,25 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Imipramini 0,025 D.t.d. №20 * S. По 1 таблетке 3 раза в сутки. Rp.: Sol. Imipramini 1,25% -2 ml D.t.d. № 10 in amp. *S. В мышцу по 2 мл 2 раза в сутки						ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AA02 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Калия перманганат (в концентрации 45% и более)	порошок для приготовления раствора	для без рецепта	прекурсор НС и ПВ	+		отпускается без рецепта врача ³		отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
Карбахол (Карбахолин, МИО-ХОЛ)	0,01% раствор во флаконах по 1 мл для внутриглазного введения	Рр.: Sol. Carbacholini 0,01% - 1 ml D.t.d. №10 *S. В каждый глаз по 1 капле 3 раза в сутки	ЯВ	+		148-1/у-88		ФТГ М- и Н-холиномиметик рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Кветиапин (Виктоэль, Гедонин, Кветиакс, Кветиакс СР, Кветиапин Канон Пролонг, Кветитекс, Кетиап, Кетилепт, Кументаль, Лаквель, Нантарид, Сервитель, Сероквель, Сероквель Пролонг)	таблетки по 25 мг таблетки по 100 мг таблетки по 150 мг таблетки по 200 мг таблетки пролонгированного действия по 50 мг, 150 мг, 200 мг	Рр.: Quetiapini 0,2 D.t.d. №60 in tabl. prolonga *S. Внутрь по 1 таблетке в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AH04 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Кетамин (Кетамина гидрохлорид)	5 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	стационарный ЛП, по рецептам не отпускается	ПВ Списка II	+	х	-		используется для наркоза только в условиях стационара, по рецептам не отпускается
Клозапин (Азалептин, Клозастен, Лепонекс)	таблетки по 25 мг таблетки по 100 мг	Рр: Clozapini 25 mg D.t.d. № 50 in tabl. *S Внутрь, 1 таб. после еды, 2-3 раза в день.	СВ	+		148-1/у-88		ФТГ антипсихотическое средство (нейролептик) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кломипрамин (Анафранил, анафранил СР, Клофранил)	таблетки по 25 мг таблетки пролонгированного действия по 75 мг 1,25 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Рр.: Tabl. Clomipramini 0,025 D.t.d. № 30 *S. Внутрь по 2 табл. 2 раза в сутки Рр.: Sol. Clomipramini 1,25%-2 ml D.t.d. № 10 in amp. *S. В мышцу по 25 mg в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AA04 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Клоназепам	таблетки по 0,5 мг таблетки по 2 мг	Рр.: Tabl. Clonazepamі 2 mg D.t.d. № 30 * S. Внутрь по 1табл. 2 раза в сутки.	ПВ Списка III	+	Х	148-1/y-88	-	ФТГ Противозиплептическое средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Клонидин (Клофелин)	таблетки по 0,075 мг таблетки по 0,15 мг 0,01% раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 0,25% раствор глазные капли	Рр.: Clonidini 0,075 mg D.t.d. № 50 in tabl. *S. Внутрь, по 1 таблетке 2- 3 раза в сутки Рр.: Sol. Clonidini 0,01% 1 ml D.t.d. №5 in amp. *S. В/м 1 мл 2 раза в сутки Рр.:Sol. Clonidini 0,25%- 5 ml D.*S. По 1-2 капли 2-3 раза в день в каждый глаз.	СВ	+		148-1/y-88	1 упаковка таблеток по 0,075 мг или 0,15 мг; 1 упаковка ампул 0,01% раствора; 5 тубиок- капельниц капель глазных 0,25% раствора	ФТГ Гипотензивное средство центрального действия рецепты хранятся в аптечной организации 3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Кодеин (кодеина основание, кодеина фосфат)</p>	<p>таблетки</p>	<p>Рр.: Codeini phosphatis sesquidrigati 0,01 Paracetamoli 0,25 Propirphenazoni 0,21 Cophеini 0,05 D.t.d. № 20 in tabl. * S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки</p>	<p>НС</p>	<p>+</p>	<p>х</p>	<p>специальный рецептурный бланк 107/у-НП</p>	<p>-</p>	<p>рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет</p>
<p>кодеина фосфат сесквигидрат 0,01 г (10 мг), парацетамол 0,25 г (250 мг), пропифеназон 0,21 г (210 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), (Каффетин)</p>	<p>таблетки</p>	<p>Рр.: Codeini phosphatis 0,008 Paracetamoli 0,5 D.t.d. № 30 in tabl. * S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки</p>	<p>комбинированный ЛП</p>	<p>+</p>		<p>148-1/у-88</p>	<p>20-24 таблетки 1</p>	<p>ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>кодеина фосфат 0,008 г (8 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг) (Коделмикст®)</p>	<p>таблетки</p>		<p>комбинированный ЛП</p>	<p>+</p>		<p>148-1/у-88</p>	<p>30 таблеток 1</p>	<p>ФТТ анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>кодеин 0,008 г (8 мг), травы термopsis лапчатного 0,02 г (20 мг), натрия гидрокарбоната 0,2 г (200 мг), солодки корней в порошке 0,2 г (200 мг) (Коделак)</p>	таблетки	<p>Rp.: Codeini 0,008 Herbae Thermopsis lanceolatae 0,02 Natrii hydrocarbonatis 0,2 Radices Glycyrrhizae 0,2 D.t.d: № 20 in tabl. S: Внутрь, по 1 табл. 2-3 раза в сутки.</p>	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	20 таблеток ¹	<p>ФТТ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>на 100 мл сиропа: кодеина фосфата – 0,09 г (90 мг), экстракта термopsisа сухого – 0,2 г (200 мг), экстракта корня солодки сухого – 3,3 г, экстракта чабреца жидкого – 20,0 г (Коделак фито)</p>	сироп	<p>Rp. : Codeini phosphatis 0,09 Extr. Thermopsisidis sicci 0,2 Extr. radices Glycyrrhizae spissi 3,3 Extr. Thymusi fluidi 20,0 Sacchari syrupi ad 100 ml D. *S. По 10 мл 3 раза в сутки.</p>	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	<p>2 флакона по 125 мл, 2 флакона по 100 мл, 5 флаконов по 50 мл (*)</p>	<p>ФТТ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>кодеин 0,008 г (8 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг)</p>	таблетки	<p>Rp.: Codeini 8 mg Paracetamoli 500 mg D.t.d.№20 in tabl. * S:Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки</p>	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	20 таблеток ¹	<p>ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012 № 562н</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кодеина фосфат (в форме гемигидрата) 0,008 г (8 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг), дрогаверина гидрохлорид 0,04 г (40 мг) (Нюшпалгин, Юниспаз)	таблетки	Рр.: Codeini phosphatis 8 mg Drotaverini hydrochloridi 40 mg Paracetamoli 500 mg D.t.d. №24 in tabl. * S: Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	24-30 таблеток 1	ФТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство+спазмолитическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздравасопразвигтия России от 17.05.2012 № 562н
кодеин 0,01 г (10 мг), ибупрофен 0,2 г (200 мг) (Нурофен плюс)	таблетки	Рр.: Codeini 10 mg Ibuprofeni 200 mg D.t.d. №20 in tabl. *S: По 1 таблетке 3 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	20 таблеток 1	ФТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздравасопразвигтия России от 17.05.2012 № 562н
кодеин фосфат 0,008 г (8 мг), кофеин 0,03 г. (30 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг) (Солпадеин)	таблетки таблетки растворимые	Рр.: Codeini phosphatis 0,008 Coffeini 0,03 Paracetamoli 0,5 D.t.d. №24 in tabl. S. Внутрь по 2 табл. до 4 раз в сутки	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	24 -28 таблеток 1	ФТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 5 приказа Минздравасопразвигтия России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кодеин фосфат полугидрат 0,008 г (8 мг), кофеин 0,03 г. (30 мг), парацетамол 0,5 г (500 мг) (Солпадеин)	капсулы	Rp.: Codeini phosphatis 0,008 Coffeini 0,03 Paracetamoli 0,5 D.t.d. № 30 in capsulis *S: Принимать по 1 табл. при боли	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	30 капсул ¹	ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+анальгезирующее ненаркотическое средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пл. "а" п. 5 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012.№ 562н
кодеина 0,008 г (8 мг), терпингидрат 0,25 г (250 мг), натрия гидрокарбоната 0,25 г (250 мг) (Терпинкод)	таблетки	Rp.: Codeini 0,008 Therpinhydrati 0,25 Natrii hydrocarbonatis 0,25 D.t.d. № 20 in tabl. *S: Внутрь по 1 табл. 2-3 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	20 таблеток ¹	ФТГ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое опиоидное средство+отхаркивающее средство) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пл. "а" п. 5 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012.№ 562н
кодеин фосфат 0,008 г (8 мг) или кодеин 0,006 г (6 мг), метамизол натрий 0,3 г (300 мг), ибупрофен 0,2 г (200 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), фенобарбитал 0,01 г (10 мг) (Пентабуфен)	таблетки	Rp.: Codeini 6 mg Coffeini 50 mg Ibupropheni 200 mg Methamizoli natrii 300 mg Phenobarbitali 10 mg D.t.d. №30 in tabl. *S: Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки, запивая водой.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	30 таблеток ¹	ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пл. "а" п. 5 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012.№ 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кодеин 0,008 г (8 мг), метамизол натрий 0,3 г (300 мг), напроксен 0,1 г (100 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), фенобарбитал 0,01 г (10 мг) (Пенталгин-Н, Ширалгин)	таблетки	Rp.: Codeini 0,008 Phenobarbitali 0,01 Methamizoli natrii 0,3 Naproxeni 0,1 Coffeini 0,05 D.t.d. № 20 in tabl. *S: Внутрь, по 1 табл. 1-3 за в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	20 таблеток ¹	ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012 № 562н
кодеина фосфат 0,008 г (8 мг), пропиофеназон 0,25 г (250 мг), парацетамол 0,3 г (300 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), фенобарбитал 0,01 г (10 мг) (Пенталгин Плюс)	таблетки	Rp.: Codeini phosphatis 8mg Coffeini 50 mg Paracetamoli 300 mg Propyphenazoni 250 mg Phenobarbitali 10 mg D.t.d. № 24 in tabl. *S: Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	24 таблетки ¹	ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012 № 562н
кодеин фосфат (моногидрат) 0,008 г (8 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), метамизол натрия 0,3 г (300 мг), парацетамол 0,3 г (300 мг), фенобарбитал 0,01 г (10 мг) (Пенталгин-ICN, Сантопералгин)	таблетки	Rp.: Codeini phosphatis 8mg Coffeini 50 mg Methamizoli natrii 300 mg Paracetamoli 300 mg Phenobarbitali 10 mg D.t.d. 30 in tabl. *S: Внутрь по 1 таблетке 4 раза в сутки.	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	24 - 30 таблеток ¹	ФТТ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство+НПВП+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравасоцразвития России от 17.05.2012 № 562н

<p>1</p> <p>кодеина моногидрат 0,008 г (8 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), метамизол натрия 0,3 г (300 мг), фенobarбитал 0,01 г (10 мг) (Сантоитралгин, Тетралгин)</p>	<p>2</p> <p>таблетки</p>	<p>3</p> <p>Rp.: Codeini monohydrati 8 mg Coffeini 50 mg Methamizoli natrii 300 mg Phenobarbitali 10 mg D.t.d. 20 in tabl. *S: Внутрь по 1 таблетке при боли</p>	<p>4</p> <p>комбинированный ЛП</p>	<p>5</p> <p>+</p>	<p>6</p>	<p>7</p> <p>148-1/у-88</p>	<p>8</p> <p>20 таблеток</p>	<p>9</p> <p>ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство +НПВП +анальгезирующее ненаркотическое средство+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравасопразвигтия России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>кодеин фосфат (гемигидрат) 0,01 г (10 мг), кофеин 0,05 г. (50 мг), метамизол натрия 0,15 г (150 мг), парацетамол 0,3 г (300 мг), фенobarбитал 0,015 г (15 мг) (Седал-М, Седалгин-Нео)</p>	<p>таблетки</p>	<p>Rp.:Codeini phosphatis 0,01 Coffeini 0,05 Methamizoli natrii 0,15 Paracetamoli 0,3 Phenobarbitali 0,015 D.t.d. № 20 in tabl. *S: Принимать по 1 таблетке при боли</p>	<p>комбинированный ЛП</p>	<p>+</p>		<p>148-1/у-88</p>	<p>20 таблеток</p>	<p>ФТГ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее опиоидное средство +НПВП +анальгезирующее ненаркотическое средство+психостимулирующее средство+барбитурат) рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит НС Списка II в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 5 приказа Минздравасопразвигтия России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>Кокаин (кокаина гидрохлорид)</p>	<p>субстанция</p>		<p>НС</p>	<p>+</p>	<p>х</p>	<p>специальный рецептурный бланк 107/у-НП</p>	<p>-</p>	<p>ФТГ Местный анестетик рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Левомепромазин (Тизерцин)	таблетки по 25 мг 2,5 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp: Levomepromazini 25mg D.t.d. № 28 in tabl. *S: Внутрь по 1 табл. 2 раза в день Rp.: Sol. Levomepromazini 2,5%- 1 ml D.t.d. №5 in amp. *S В/м 1 мл 2 раза в сутки	СВ	+		148-1/у-88	-	ФПГ Нейролептики рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Лития карбонат (Седалит)	таблетки 300 мг	Rp.: Lithii carbonatis 300 mg D.t.d. №50 in tabl. *S: Внутрь по 3 таблетки 3 раза в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФПГ Нормотимическое средство код АТХ N05AN01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Лоразепам (Лорафен)	таблетки по 1 мг таблетки по 2,5 мг	Rp.: Lorazepam 1 mg D.t.d. № 25 in tabl. *S: Внутрь по 1 табл. 1 раз в сутки	ЛВ Сливка III	+	х	148-1/у-88	-	ФПГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Луразидон (Латуда)	таблетки по 20 мг	Rp.: Tabl. Lurasidoni 20 mg D.t.d. № 7 *S: Внутрь по 2 табл. 1 раз в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФПГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AE05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мапротилин (Людиомил)	таблетки по 10 мг таблетки по 25 мг	Rp.: Tabl. Maprotilini 25mg D.t.d. №30 *S: Внутрь по 1 табл. 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AA21 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Медазепам (Мезапам, Рудотель)	таблетки по 10 мг	Rp.: Medazepamі 10 mg D.t.d. № 50 in tabl. *S: Внутрь перед приемом пищи, 3 раза в сутки по 1 таблетке.	ПВ Слоска III	+	х	148-1/у-88	-	ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Мелатонин (Циркадин)	таблетки пролонгированного действия по 2 мг	Rp.: Tabl. Melatoninі 2 mg D.t.d. №30 *S: По 1 таблетке перед сном	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Снотворное средство код АТХ N05CH01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Метандиенон (Метандростеноло н)	таблетки по 5 мг	Rp.: Tabl. Metandienoni 5mg D.t.d. №100 *S: По 1 таблетке 2 раза в сутки	СВ	+		148-1/у-88	1 упаковка	ФТГ Анаболики рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Миансерин (Леривон)	таблетки по 30 мг	Rp.: Tabl. Mianserini 30 mg D.t.d. №10 *S: Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AX03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Мидазолам (Дормикум, Мидазолам- хамельн, Фулсед)	0,5% раствор в ампулах по 1 мл и по 3 мл для инъекций	Rp.: Sol. Midazolami 5 mg/ml – 1ml D.t.d. № 10 in amp. *S: Вводить внутримышечно по 1 мл.	ПВ Слоска III	+	х	148-1/у-88	-	ФТГ Снотворное и седативное средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Милнаципран (Иксел)	капсулы по 25 мг	Rp.: Milnaciprani 25 mg D.t.d. №50 in capsulis *S: 2 таблетки 2 раза в сутки, в первой половине дня.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AX17 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Миртазапин (Каликта, Мирзаген, Мирзаген Кутаб, Миртазонал, Мирталан, Ноксибел, Ремерон, Эспритал)	таблетки по 15 мг таблетки по 30 мг таблетки по 45 мг таблетки для рассасывания по 15 мг	Rp.: Tabl. Mirtazapini 30 mg D.t.d. №30 *S. По 1 таблетке 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AX11 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Морфин (Морфина гидрохлорид, Морфина сульфат, МСТ континус)	таблетки пролонгированного действия по 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг капсулы пролонгированного действия по 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг 1 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Morphini 100 mg D.t.d. № 20 (двадцать) in tabl.seu capsulis prolonga *S. Внутрь, не разжевывая, каждые 12 часов по 1 таблетке (капсуле) Rp.: Sol. Morphini 10 mg/ml - 1 ml D.t.d. № 20 (двадцать) in amp. *S. Вводить подкожно 1мл. при прорывах боли	НС	+	х	специаль ный рецептур ный бланк 107/y-НП	20 ампул (шприц- тюбиков); 180 табл. (капс.) по 10 мг; 60 табл. (капсул) по 30 мг; 40 табл. (капсул) по 60 мг; 20 табл. (капс.) по 100 мг; 20 табл.(капсул) по 200 мг ²	ФТГ Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Морфолиноэтил иозтоксибензими дазол (Нейрофазол)	0,5 % концентрат для приготовления инфузий во флаконах по 2 мл	Rp.: Morpholinoethylthioethoxy- benzimidazole 0,5%-2ml D.t.d. № 10 *S. Для инфузий	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Анксиолитики код АТХ N05BX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Метилакрилат (в концентрации 15% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		отнесен к таблице II Списка IV прекурсоров
Метилметакрилат (в концентрации 15% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		отнесен к таблице II Списка IV прекурсоров
Налбуфин (Налбуфина гидрохлорид, Налбуфин Серб)	2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.:Sol. Nalbuphini 10 mg/ml – 1 ml D.t.d. № 50 (пятьдесят) in amp. *S. Вводить внутримышечно по 1 мл.	ПВ Списка III	+	x	148-1/y-88	50 ампул 1% раствора по 1 мл; 25 ампул 2% раствора по 1 мл ²	ФТГ Опиоидные наркотические анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Нандролон (Ретаболил)	5% масляный раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp: Sol. Nandroloni oleosae 50 mg/ml -1 ml D.t.d №1 in amp *S.В мышцу 1 мл. каждые 3-4 недели	СВ	+		148-1/y-88	1 упаковка	ФТГ Анаболики рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Натрия оксибутират (Натрия оксибат)	20 % раствор в ампулах по 5 мл для инъекций	в стационарный ЛП, используется для наркоза	ПВ Списка III	+		-		ФТГ Наркозные средства, Антигипоксанты и антиоксиданты в ампулах используется для наркоза, по рецептам не отпускается
Нитразепам	таблетки по 5 мг	Rp.: Tabl. Nitrazepamі 5mg D.t.d. №20 *S.По 1таб. за 30 минут до сна.	ПВ Списка III	+	x	148-1/y-88	-	ФТГ Снотворное средство рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оксазепам (Нозепам, Тазепам)	таблетки по 10 мг	Rp.: Tabl. Oxazepamі 10mg D.t.d. №50 *S. Внутрь, по 1табл. 2-3 раза в сутки	ЛПв Списка III	+	x	148-1/у-88	-	ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Оланзапин (Заласта, Заласта Кутаб, Зипрекса, Зипрекса Зидис, Нормитон, Оланекс, Парнасан, Эголанза)	таблетки по 2,5 мг таблетки по 5 мг таблетки по 10 мг таблетки по 15 мг таблетки по 20 мг таблетки диспергируемые по 10 мг, по 15 мг, по 20 мг	Rp.: Tabl. Olanzapinі 15 mg D.t.d. №30 *S. По 1 таб.1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AH03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Омнопон	1 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Sol. Omnoponi 1 %- 1ml D.t.d. №20 (двадцать) in amp. *S. Подкожно по 1 мл	НС	+	x	специаль ный рецептур ный бланк 107/у-НП	20 ампул 1% раствора по 1 мл, 20 ампул 2% раствора по 1 мл ²	ФТГ Опииодные наркотические анальгетики в комбинациях рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Оксикодон 5 мг, Налоксон 2,5 мг (10мг+5мг; 20 мг+10 мг; 40 мг+20 мг) (Таргин)	таблетки пролонгированного действия	Rp.: Oxycodoni 5 mg Naloxoni 2,5 mg D.t.d. №100 (сто) in tabl. *S. Внутрь 1 таб. каждые 12 часов	НС	+	x	148-1/у-88	100 табл. (5 мг + 2,5 мг) 60 табл. (10 мг + 5 мг) 40 табл. (20 мг + 10 мг) 20 табл. (40 мг + 20 мг)	ФТГ Анальгезирующее наркотическое средство: опиоидных рецепторов агонист-антагонист рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Палиперидон (Инвега, Ксеплион, Тревикта)	таблетки пролонгированного действия по 3 мг и по 12 мг 10 % суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия в шприце по 0,25 мл, по 0,5 мл, 0,75 мл, 1 мл, 1,5 мл	Рр.: Tabl. Paliperidoni 3 mg D.t.d. №28 *S. По 1 таб. 1 раз в сутки утром независимо от приема пищи. Рр.: Susp. Paliperidoni 10%- 0,5ml D. *S. В/м 0,5мл. 1 раз в 3 месяца	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AX13 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Пароксетин (Адепресс, Актапароксетин, Паксил, Плизил, Плизил Н, Рексетин, Сирестилл)	таблетки по 20 мг 1 % раствор, капли для приема внутрь во флаконах	Рр.: Tabl. Paroxetini 20mg D.t.d. №30 *S. Внутрь по 1 таб. 1 раз в сутки, утром, во время еды	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AB05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Перициазин (Неулептил)	капсулы по 5 мг капсулы по 10 мг 4 % раствор для приема внутрь во флаконах	Рр.: Periciazini 5 mg D.t.d. № in capsulis S.1 капсула 3-4 раза в сутки, большую часть суточной дозы принимают в вечерние часы.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AC01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Перфеназин (Эталпазин)	таблетки по 4 мг таблетки по 10 мг	Рр.: Tabl. Perphenazini 4mg D.t.d. №50 *S. По 1 таб. 3 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AB03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прегабалин (Альгерика, Лирика, Прабегин, Прегабано, Пригабидон, Реплика)	капсулы по 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 300 мг	Rp.: Pregabalin 75 mg D.t.d. №60 in capsulis *S. По 1 капсуле дважды в день	ЛП, подлежащий ПКУ	+		148-1/у-88		ФТГ Противозипелитическое средство рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Промазин	таблетки по 25 мг	Rp.: Tabl. Promazini 25 mg D.t.d. №50 *S. Внутрь по 1 таб. каждые 6 часов	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AA03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Пропронилолфенил этоксизилпипер идин (Просидол)	таблетки зашечные 20 мг	Rp.: Propioniphenyletoxy- ethylpiperidini 20 mg D.t.d. № 10 (десять) *S. Буккально по 1таблетке	НС	+	х	специальн ый рецептурн ый бланк 107/у-НП	50 таблеток	ФТГ Анальгезирующее наркотическое средство хранятся в аптечной организации 5 лет
Псевдоэфедрин (в концентрации 10% и более)	субстанция		прекурсор НС и ПВ	+		-		отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров
Пчелиный яд (за исключением лекарственных форм для наружного применения - кремы, мази, гели)	в чистом виде не применяется		ЯВ	+		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рисперидон (Лептинорм, Нейпилепт, Ридонекс, Рилепт, Рилептид, Рисдонал, Риспаксол, Ряспен, Рисполепт, Рисполепт Квиклет, Рисполепт Конста, Рисполюкс, Риссет)	таблетки по 0,5 мг, по 1 мг, по 2 мг, по 3 мг, по 4 мг для таблетки рассасывания по 0,5 мг, по 1 мг, по 2 мг 0,1 % раствор для приема внутрь во флаконах	Рр.: Tabl. Risperidoni 1 mg D.t.d. №20 *S. По 1 таб. 2 раза в сутки. Рр.: Sol. Risperidoni 0,1%-30 ml. D.*S. Внутрь 4 мг 1 раз в сутки Рр.: Risperidoni 25 mg D.t.d. №5 *S. В/м 25мг.	ЛП по коду АТХ	++		107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AX08 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Серная кислота, не исключающая соли, (в концентрации 45% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ			-		химический реактив, отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
Сертиндол (Сердолект)	таблетки по 12 мг	Рр.: Tabl. Sertindoli 12 mg D.t.d. №28 *S.1 таб. внутрь один раз в день, вне зависимости от приема пищи	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AE03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Сертралин (Алевал, Асентра, Золофт, Серенага, Серлифт, Стимулотон, Торин)	таблетки по 25 мг таблетки по 50 мг таблетки по 100 мг	Рр.: Tabl. Sertralini 25 mg D.t.d. №28 *S.1 таб. внутрь один раз в день	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AB06 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сибутрамин (Голдлайн, Линдакса, Слимия)	капсулы по 10 мг капсулы по 15 мг	Rp.: Sibutramini 15 mg D.t.d. № 30 in capsulis *S. Внутрь 1 капсула утром запить достаточным количеством воды	СВ	+		148-1/y-88	-	ФТГ Регуляторы аппетита, ожирения средство лечения рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Соляная кислота, не исключающая соли, концентрации 15% и более)	является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		химический реактив, отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
Суворексант (Белсомра)	таблетки по 15 мг	Rp.: Tabl. Suvorexanti 15mg D.t.d. №20 *S. Внутрь 1 таблетку на ночь	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Снотворное средство код АТХ N05CM19 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Сульпирид (Сульпирид Белупо, Бетамакс, Просульпин, Эглонил)	таблетки по 50 мг, 100 мг, по 200 мг капсулы по 50 мг, по 200 мг 4 % раствор для приема внутрь во флаконах 5 % раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Sulpiridi 50 mg D.t.d. №30 *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки Rp.: Sulpiridi 50 mg D.t.d. №24 in capsulis *S. Внутрь по 1 капсуле 2 раза в сутки Rp.: Sol. Sulpiridi 4%- 150 ml D.*S. Rp.: Sol. Sulpiridi 5%- 2 ml D.t.d. №10 in amp * S.B/м 2мл.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AL01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-тестостерон за исключением лекарственных форм для наружного применения - кремы, мази, гели (Небидо, Андриол ТК, Омнадрен 250, Сустанон-250)	1% масляный раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 5% масляный раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 25% масляный раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 25% масляный раствор в ампулах по 4 мл для инъекций капсулы по 40 мг	Rp.: Sol. Testosteroni oleosae 10 mg/ml - 1 ml D.t.d. № 10 in amp. *S. Внутримышечно 1 мл через 1-2 дня Rp.: Testosteroni 40 mg D.t.d. № 30 in capsulis *S. Внутрь 1 капсула 2 раза в сутки	СВ	+		148-1/у-88	-	ФТГ Андрогены, антиандрогены рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
1-тестостерон лекарственные формы для наружного применения - кремы, мази, гели (Андрогель)	гель для наружного применения 1 %	Rp.: Gel. Testosteroni 1%- 75,0 D.*S. Наносить тонким слоем 1 раз в сутки	СВ			107-1/у ⁵	-	ФТГ Андрогены, антиандрогены
Тетраметилгетраазициклооктан дион (Адаптол, Мебикар, Мебикс)	таблетки по 300 мг таблетки по 500 мг	Rp.: Tabl. Tetramethyltetraazabi- cyclooctandioni 500 mg D.t.d. №20 *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) код АТХ N05BX рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Тианептин (Коаксил)	таблетки по 12,5 мг	Rp.: Tianepitini 12,5 mg D.t.d. № 30 in tabl. *S. Внутрь, перед едой, по 1 таблетке 3 раза в сутки.	ЛВ Списка III	+	X	148-1/у-88	-	ФТГ Антидепрессанты рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тиоприд (Тиопридал)	таблетки по 100 мг 5% раствор в ампулах по 2 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Tiopridi 100 mg D.t.d. №30 *S.Внутрь по 2 таблетке 2 раза в сутки Rp.: Sol. Tiopridi 5%- 2 ml D.t.d. №30 in amp *S.В мышцу по 2мл 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05A103 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Тиопентал натрия	порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения флаконы по 0,5 г и 1,0 г	стационарный ЛП, используется для наркоза	СВ	+		-		используется для наркоза в условиях стационара, по рецептам не отпускается
Тиопроперазин (Мажептил)	таблетки по 10 мг	Rp.: Tabl. Thioroprazini 10 mg D.t.d. №20 * S.внутрь по 1/2 таблетки 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AB08 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Тиоридазин (Сонапакс, Тиодазин, Тиорил, Тисон)	таблетки по 10 мг таблетки по 25 мг драже по 25 мг	Rp.: Tabl. Thioridazini 10mg D.t.d. №25 *S.Внутрь по 2 и 1/2 таблетки 1 раз в сутки Rp.: Dragee Thioridazini 25 mg D.t.d. №60 *S.Внутрь по 1 драже 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AC02 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толуол (в концентрации 70% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++		-		химический реактив, отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
Тофизолам (Грандаксин)	таблетки по 50 мг	Rp.: Tabl. Tofisorami 50mg D.t.d. №20 *S. Внутрь по 2 таблетки 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) код АТХ N05BA23 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Тразодон (Триттико)	таблетки пролонгированного действия по 150 мг	Rp.: Tabl. Trazodoni 150mg D.t.d. №20 *S. Внутрь по 1 табл. 1 раз в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AX05 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Трамадол (Трамал, Трамакლოსидол, Трамадол Ретард, Трамал Ретард, Трамадол ГР)	капсула по 50 мг таблетки по 50 мг и 100 мг таблетки пролонгированного действия по 100 мг, 150 мг и 200 мг капли для приема внутрь 10 % раствор суппозитории ректальные по 100 мг 5 % раствор в ампулах	Rp.: Tramadoli 50 mg D.t.d. № 20 in capsulis *S. Внутрь 1 капсул. при болях Rp.: Sol. Tramadoli 10%- 10 ml D.*S. По 20 капель при болях	СВ	+		148-1/у-88	-	ФТГ Анальгезирующее средство со смешанным механизмом действия рецепты хранятся в аптечной организации 3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трамидола 37,5 мг + парацетамол 325 мг (Залдлар, Рамлетса, Трамацета, Форсодол)	37,5 таблетки парацетамол 325 мг капсулы	<p>Rp.: Tramadolі 37,5 mg D.t.d. № 20 in tabl.prolonga *S. Внутрь по 1 табл. 1 раз в день</p> <p>Rp.: Sol. Tramadolі 5%- 2 ml D.t.d. №10 in amp *S.Внутрьмышечно по 2 мл при болях</p> <p>Rp.: Supp.cum Tramadolo 0,1 D.t.d. № 10 *S.В прямую кишку по 1 свече</p>	<p>ЛП, подделка ПКУ и содержащий СВ</p>	+		148-1/у-88	-	ФТГ Анальгезирующее средство со смешанным механизмом действия рецепты хранятся в аптечной организации 3 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тригексифенидил (Циклодол)	таблетки по 2 мг	Rp: Tabl. Trihexurphenidyl 2 mg D.t.d. № 50 *S. Внутрь, начальная доза 0,5-1 мг/сут, при необходимости доза увеличивается до 5-10 мг/сут	СВ	+		148-1/у-88	-	ФТГ Холиноблокатор центральный рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Тримеперидин (Промедол)	1 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций 2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций таблетки по 25 мг	Rp.: Trimeperidini 25 mg D.t.d. №50 (пятьдесят) in tabl. *S. Внутрь по 1 табл. при болях Rp.: Sol. Trimeperidini 10 mg/ml -1 ml D.t.d. № 20 (двадцать) in amp. *S. Вводить внутримышечно 1мл при болях	НС	+	х	специальный рецептурный бланк 107/у-НП	20 ампул (шприц- тюбиков); 50 таблеток по 25 мг ²	ФТГ Опиоидные анальгетики рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Трифлуоперазин (Трифазин)	таблетки по 5 мг 0,2 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Tabl. Trifluoperazini 5 mg D.t.d. №20 *S. Внутрь по 1/2 таблетки 2 раз в сутки Rp.: Sol. Trifluoperazini 0,2% - 1 ml D.t.d. №10 in amp *S. В мышцу 1 мл 2 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Нейролептик, противорвотное средство код АТХ N05AB06 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трихлорметан (Хлороформ)	не является лекарственным средством		СВ	+				
Тропикамид (Мидриатикум- Штульн Мидриацил)	0,5 % раствор, капли глазные 1 % раствор, капли глазные	Рр.: Sol. Tropicamidi 0,5 % - 5 ml D. *S. В каждый глаз по 2 капли. Между каплями следует соблюдать интервал в 5 минут.	ЛП, подлежащий ПКУ	+		148-1/у-88		ФТГ М-холиноблокатор рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Уксусная кислота (в концентрации 80% и более)	не является лекарственным средством		прекурсор НС и ПВ	++				отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров
Фенилпропанола мин (в концентрации 10% и более)	субстанция		прекурсор НС и ПВ	+		-		отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров
Фенобарбитал	таблетки по 5 мг таблетки по 50 мг таблетки по 100 мг	Рр.: Phenobarbitali 100 mg D.t.d. № 50 in tabl. *S. Внутрь по 1 таблетке	ЛВ Списка III	+	х	148-1/у-88	50 таблеток по 100 мг ¹	ФТГ Прогивозипелитические средства, Снотворные средства рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет

<p>1</p> <p>фенобарбитала 0,025 г (25 мг), бромизовала 0,1 г (100 мг), кальция глюконата 0,25 г (250 мг), кофеина-бензоата натрия 0,0075 г (7,5 мг), папаверина гидрохлорида 0,015 г (15 мг), (Паглюферал 1)</p>	<p>2</p> <p>таблетки</p>	<p>3</p> <p>Rp.: Phenobarbitali 0,025 Bromisovali 0,1 Calcii gluconatis 0,25 Coffeini natrio-benzoatis 0,0075 Papaverini hydrochloridi 0,015 D.t.d. № 10 in tabl. *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.</p>	<p>4</p> <p>комбинированный ЛП</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p> <p>107-1/у⁵</p>	<p>8</p>	<p>9</p> <p>ФТГ Противозипилептическое средство содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "е" п. 4 приказа Минздравооцразвития России от 17.05.2012 № 562Н</p>
<p>фенобарбитала 0,025 г (25 мг), бромизовала 0,1 г (100 мг), кальция глюконата 0,25 г (250 мг), кофеина-бензоата натрия 0,0075 г (7,5 мг), папаверина гидрохлорида 0,035 г (35 мг), (Паглюферал 2)</p>	<p>таблетки</p>	<p>Rp.: Phenobarbitali 0,025 Bromisovali 0,1 Calcii gluconati 0,25 Coffeini natrio-benzoatis 0,0075 Papaverini hydrochloridi 0,035 D.t.d. № 10 in tabl. *S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.</p>	<p>комбинированный ЛП</p>			<p>107-1/у⁵</p>		<p>ФТГ Противозипилептическое средство содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "е" п. 4 приказа Минздравооцразвития России от 17.05.2012 № 562Н</p>

1	<p>Фенобарбитала 0,05 г (50 мг), бромизовала 0,15 г (150 мг), кальция глюконата 0,25 г (250 мг), кофеина-бензоата натрия 0,01 г (10 мг), папаверина гидрохлорида 0,02 г (20 мг) (Паглюферал 3)</p>	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Фенобарбитала 0,02 г (20 мг), бендазола 0,02 г (20 мг), метамизола натрия 0,25 г (250 мг), папаверина гидрохлорида 0,02 г (20 мг) (Андипал)</p>	таблетки	<p>без рецепта</p>	<p>комбинированный ЛП</p>	<p>комбинированный ЛП</p>			<p>107-1/у⁵</p>		<p>ФТГ Противозлепегическое средство содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "е" п. 4 приказа Минздрава России от 17.05.2012 № 562н</p>
							<p>отпускается без рецепта врача³</p>		<p>содержит ПВ Списка III в малом количестве</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>В 1 мл: мяты перечной листьев масла 0,00129 г (1,29 мг), хмеля соплодий масла 0,00018 г (0,18 мг), Фенобарбитала 0,0184 г (18,4 мг), этилбромизовалерианата 0,0184 г (18,4 мг) (Валокордин)</p>	<p>Капли для приема внутрь</p>	<p>без рецепта</p>	<p>комбинированный ЛП</p>			<p>отпускается без рецепта врача³</p>		<p>содержит ПВ Списка III в малом количестве</p>
<p>В 1 мл: мяты перечной листьев масла 0,00142 г (1,42 мг), Фенобарбитала 0,01826 г (18,26 мг), этилбромизовалерианата 0,02 г (20 мг) 1 таблетка: этилбромизовалерианата 0,0082 г (8,2 мг), Фенобарбитала 0,0075 г (7,5 мг), мяты перечной листьев масла 0,00058 г (0,58 мг) (Корвалол)</p>	<p>Капли для приема внутрь</p>	<p>без рецепта</p>	<p>комбинированный ЛП</p>			<p>отпускается без рецепта врача³</p>		<p>содержит ПВ Списка III в малом количестве</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
В 1 мл: мяты перечной листьев масла 0,0014 г (1,4 мг), испанского хмелевого масла (душицы масла) 0,0002 г (0,2 мг), фенобарбитала 0,02 г (20 мг) , этилбромизовалериана 0,02 г (20 мг) (Валосердин)	капли для приема внутрь	без рецепта	комбинированный ЛП			отпускается без рецепта врача ³		содержит ПВ Списка III в малом количестве
Фентанил (Дюрогезик Матрикс, Долфорин, Фендивия, Фентадол Матрикс, Фентадол Резервуар)	0,005% раствор в ампулах по 1 мл и 2 мл для инъекций трансдермальные терапевтические системы (ТТС) в дозировках по 12,5 мкг/час, 25 мкг/час, 50 мкг/час, 75 мкг/час, 100мкг/час	Рр.: Phentaniли TTS 75 mkg/h D.l.d. № 10 (десять) *S. Пластырь наклеивать на кожу на 72 часа.	НС	+	х	148-1/у-88 для трансдермальной формы	ТТС 20 пластырей по 12,5 мкг/час; 20 пластырей по 25 мкг/час; 10 пластырей по 50 мкг/час; 10 пластырей по 75 мкг/час; 10 пластырей по 100 мкг/час ²	ФТГ Анальгезирующее наркотическое средство в ампулах используется для наркоза, по рецептам не отпускается; рецепты на ТТС хранятся в аптеке 5 лет
Флувоксамин (Феварин)	таблетки по 50 мг таблетки по 100 мг	Рр.: Tabl.Fluvoxamini 100 mg D.l.d. №15 *S. Внутрь, не разжевывая и запивая небольшим количеством воды 1 таб. однократно, вечером.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Антидепрессант код АТХ N06AB08 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Флуоксетин (Прозак, Профлузак, Флунисан)	капсулы по 10 мг капсулы по 20 мг	Rp.: Fluoxetine 20 mg D.t.d №30 in capsulis *S. По 1 капсуле 1 раз в сутки в первой половине дня, независимо от приема пищи.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФПГ Антидепрессант код АТХ N06AB03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Флупентиксол (Флоанксол)	таблетки по 0,5 мг таблетки по 1 мг	Rp.: Tabl. Flupentixoli 1 mg D.t.d №50 *S. По 1 таб. 4 раза в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФПГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AF01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Флуфеназин (Модитен Делпо)	2,5 % масляный раствор в ампулах (флаконах) по 1 мл для инъекций	Rp.: Sol. Phthorphenazini oleosae 2,5 % - 1 ml D.t.d №20 in amp. *S. Глубоко внутримышечно в ягодичную область, 0,5 мл	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФПГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AB02 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Хлордиазепоксид (Элениум)	таблетки по 10 мг	Rp.: Tabl. Chlordiazepoxididi 10 mg D.t.d №20 *S. По 1 таб. 1 раз в сутки за 1-2 ч до сна.		+	х	148-1/у-88		ФПГ Анксиолитическое средство (транквилизатор) рецепты хранятся в аптечной организации 5 лет
Хлордиазепоксид 0,005 г (0,01 г), амитриптилин 0,0125 г (0,025 г) (Амиксид)	таблетки	Rp.: Chlordiazepoxididi 0,01 Amitriptylini 0,025 D.t.d №30 in tabl. *S. Внутрь по 1 таб. 2- 3 раза в день после еды.	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		ФПГ Антидепрессант-анксиолитическое средство (транквилизатор) содержит ПВ Списка III в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "з" п. 4 приказа Минздравасопразавнтя России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хлорпромазин (Аминазин)	таблетки по 25 мг таблетки по 100 мг драже по 25 мг 2,5 % раствор в ампулах по 1 мл, по 2 мл, по 5 мл, по 10 мл для инъекций	Rp: Tabl. Chlorpromazini 100 mg D.t.d №30 *S. По 1 таб. 2 раза в сутки. Rp.:Sol. Chlorpromazini 2,5 % - 1 ml D.t.d. №20 in amp. *S. Внутримышечно по 1 мл 3 раза в сутки	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антипсихотическое средство (нейролептик) код АТХ N05AA01 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Хлорпрогиксен (Труксал)	таблетки по 15 мг таблетки по 50 мг	Rp: Tabl. Chlorprothixeni 50 mg D.t.d №50 *S. Поддерживающая доза по 1 таблетке 2 раза в сутки.	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Нейролептики код АТХ N05AF03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Циклопентолат (Цикломед, Циклопентолат- СОЛОфарм, Циклоптик)	1 % раствор, капли глазные	Rp.: Sol.Cyclopentolati 1 % - 5 ml D.*S.Закапывать в конъюнктивный мешок по 1 капле 3 раза в день	ЛП, подлежащий ПКУ	+		148-1/y-88	-	ФТГ М-холиноблокатор рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Циталопрам (Опра, ПРАМ, Сюзам, Уморал, Ципрамил, Циталифт, Циталон, Цитол)	таблетки по 10 мг таблетки по 20 мг таблетки по 40 мг	Rp.: Tabl. Citalorprami 10 mg D.t.d №30 *S.Внутри по 1 таблетке один раз в сутки (не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости).	ЛП по коду АТХ			107-1/y ⁵		ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AB04 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Эргометрин концентрации 10% и более)	(в субстанция		прекурсор НС и ПВ	+		-		отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров
Эргогамин концентрации 10% и более)	(в субстанция		прекурсор НС и ПВ	+		-		отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров
эрготамина тартрага 0,0003 г (0,3 мг), фенобарбитала 0,02 г (20 мг) и суммы алкалоидов красавки 0,0001 г (0,1 мг) (Беллатаминал)	таблетки	Рр.: Ergotamini tartratis 0,3 mg Phenobarbitali 20 mg Belladonnae alkaloids 0,1 mg D.t.d № 30 in tabl. *S. Внутрь, по 1 табл. 2-3 раза в день после еды.	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		ФТГ Седативные средства в комбинациях содержит ПВ Списка III и прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "ж" п. 4 приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н
эрготамина тарtrat 0,001 г (1 мг), кофеин 0,0915 г (91,5 мг) (Кофетамин)	таблетки	Рр.: Ergotamini tartratis 1mg Coffeini 91,5 mg D.t.d №10 in tabl. *S. Внутрь по 1-2 табл. во время приступа головной боли 2 раза в день	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		ФТГ Психостимуляторы в комбинациях содержит прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 4 приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>эрготамина тартрат 0,00075 г (0,75 мг), пропифеназон 0,2 г (200 мг), кофеин 0,08 г (80 мг), камиллофрина хлорид 0,025 г (25 мг), меклоксамина цитрат 0,02 г (20 мг) (Номигрен)</p>	<p>таблетки</p>	<p>Rp.: Ergotamini tartrati 0,75 mg Propyphenazoni 200 mg Coffeini 80 mg Camyllofini chloridi 25 mg Mecloksamini citrati 20 mg D.t.d №20 in tabl. *S. Для первого приема рекомендуемая доза 1–2 табл.</p>	<p>комбинированный ЛП</p>			<p>107-1/у⁵</p>		<p>ФТГ Противомигренозное средство содержит прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 4 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>эрготамина тартрат 0,001 г (1 мг), кофеин 0,1 г (100 мг), дименгидринат 0,025 г (25 мг) (Синкаптон)</p>	<p>таблетки</p>	<p>Rp.: Ergotamini tartrati 1mg Coffeini 100 mg Dimengydrinati 25 mg D.t.d №20 in tabl. *S. При первых приступа мигрени принять 1 таблетку</p>	<p>комбинированный ЛП</p>			<p>107-1/у⁵</p>		<p>ФТГ Альфа-адреноблокаторы в комбинациях содержит ПВ Списка III и прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "а" п. 4 приказа Минздравоохранения России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>Эсцигалограм (Ленуксин, Мирацитол, Селектра, Ципралекс, ЭйСИИ, Элисея, Элисея Кутаб)</p>	<p>таблетки по 5 мг таблетки по 10 мг таблетки по 15 мг таблетки диспергируемые в полости рта по 5 мг</p>	<p>Rp.: Tabl. Escitaloprami 10 mg D.t.d №14 *S. Внутрь по 1 таблетке один раз в сутки.</p>	<p>ЛП по коду АТХ</p>			<p>107-1/у⁵</p>		<p>ФТГ Антидепрессанты код АТХ N06AB10 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Этанол (Спирт этиловый)	флаконы	Rp.: Sol. Aethanolі 70% - 100 ml D.*S. Для дезинфекции инъекционного поля .	ЛП, подлежащий ПКУ и содержащий СВ	+		148-1/у-88		ФТГ Антисептики и дезинфицирующие средства рецепты хранятся в аптечной организации 3 года
Этифоксин (Стрезам)	капсулы по 50 мг	Rp.: Etіfoxini 50 mg D.t.d. № 24 in capsulis *S. Внутрь по 1 капсуле 3 раза в сутки .	ЛП по коду АТХ			107-1/у ⁵		ФТГ Анксиолитическое средство код АТХ N05ВХ03 рецепты хранятся в аптечной организации 3 месяца
Эфедрин концентрации 10% и более)	(в субстанция		прекурсор НС и ПВ	+		148-1/у-88	5 грамм порошок	отнесен к таблице I Списка IV прекурсоров
Эфедрин раствор ампулах	5% 5 % раствор в ампулах по 1 мл для инъекций	Rp.: Sol. Ephedriні 5 % - 1 ml D.t.d. №10 in amp. *S. Для подкожного введения 1 мл раствора 1-2 раза в день.	меры контроля не установлены			107-1/у ⁵		ФТГ Гипертензивные средства, Адрено- и симпатомиметики (альфа-, бета-)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>эфедрина гидрохлорид 0,02 г (20 мг), фенobarбитал 0,02 г (20 мг), теофиллин 0,1 г (100 мг), кофеин 0,05 г (50 мг), парацетамол 0,2 г (200 мг), экстракт красавки 0,003 г (3 мг), цитизин 0,0001 г (0,1 мг) (Теофедрин-Н)</p>	таблетки	<p>Rp: Ephedrini hydrochloridi 20 mg Phenobarbitali 20 mg Theophyllini 100 mg Coffeini 50 mg Paracetamoli 200 mg Extr. Belladonnae foliae 5 mg Cytisini 0,1 mg D.t.d. №30 in tabli. *S. для купирования приступов бронхиальной астмы однократно по 2 табл.</p>	комбинированный ЛП	+		148-1/у-88	30 таблеток ¹	<p>ФТГ Теофиллин в комбинации с другими препаратами, кроме психолептиков рецепты хранятся в аптечной организации 3 года содержит ПВ Списка III и прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "и" п.5 приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>на 125 г сиропа: глауцина гидробромида 0,125 г (125 мг), эфедрина гидрохлорида 0,1 г (100 мг), масла базилика обыкновенного 0,125 г (125 мг) (Бронхотон, Бронхолитин, Бронхоцин, Бронхотусен Врамед)</p>	сироп	<p>Rp.: Glaucini hydrobromidi 0,125 Ephedrini hydrobromidi 0,1 Oleii basilici olei 0,125 Sacchari syropi 125,0 D.*S. по 10 мл 3-4 раза в день.</p>	комбинированный ЛП			107-1/у ⁵		<p>ФТГ Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое средство центрального действия)+симпатомиметическое средство прекурсор таблицы I Списка IV в малом количестве, порядок отпуска из аптек в соответствии с пп. "б" п. 4 приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н</p>
<p>Эфир диэтиловый (Эфир для наркоза стабилизированный) в концентрации 45% или более</p>	жидкость ингаляций для		прекурсор НС и ПВ	+		148-1/у-88 (для изготовления экстенпоральных ЛС)	-	<p>используется для наркоза, в чистом виде по рецептам не отпускается; отнесен к таблице III Списка IV прекурсоров</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Примечания:

¹ при выписывании и отпуска лекарственного препарата, содержащего соли кодеина производится пересчет на кодеин основание путем умножения количества соли кодеина на соответствующий коэффициент (с учетом неделимой упаковки).

Коэффициенты пересчета:

кодеин фосфат - 0,8

кодеин фосфат гемигидрат (полугидрат) - 0,74

кодеин фосфат сесквигидрат - 0,71

кодеин моногидрат - 0,94

(Основание: www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/NAR_2011_YellowList_50edition_RU.pdf)

В соответствии с пунктом 23 приложения № 1 к приказу Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н для лечения пациентов с хроническими заболеваниями могут выписываться рецепты на курс лечения до 2 месяцев. В этих случаях на рецептах должна быть надпись "По специальному назначению", скрепленная подписью медицинского работника и печатью медицинской организации "Для рецептов".

² в соответствии с пунктом 15 приложения № 1 к приказу Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н количество выписываемых наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков II и III Перечня, иных лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, при оказании пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым количеством лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт;

³ в соответствии с инструкцией по применению;

⁴ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 "О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров";

⁵ в соответствии с пунктом 22 приложения № 1 к приказу Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н пациентам с хроническими заболеваниями на рецептурных бланках формы № 107-1/у разрешается устанавливать срок действия рецепта в пределах одного календарного года. При выписывании таких рецептов медицинский работник делает пометку "Пациенту с хроническим заболеванием", указывает срок действия рецепта и периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность (ежедневно и иные периоды), заверяет это указание своей подписью и личной печатью, а также печатью медицинской организации "Для рецептов".

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 "Об утверждении списка сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного Кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного Кодекса РФ";

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

СВ - сильнодействующее вещество;

ЯВ - ядовитое вещество;

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ";

НС - наркотическое средство;

ПВ Списка II - психотропное вещество Списка II;

ПВ Списка III - психотропное вещество Списка III;

прекурсор **НС** и **ПВ** - прекурсор наркотических средств и психотропных веществ;

комбинированный ЛП - лекарственный препарат для медицинского применения, содержащий кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества, в соответствии с приказами Минздравоохранения России от 16.03.2010 № 157н "Об утверждении предельно допустимого количества наркотического средства, психотропного вещества и их прекурсора, содержащегося в препаратах" и от 17.05.2012 № 562н "Об утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества";

ЛП, подлежащий ПКУ - иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, в соответствии с пунктом IV приложения к приказу Минздрава России от 22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету";

ЛП, подлежащий ПКУ и содержащий СВ - лекарственный препарат, содержащий в составе сильнодействующее вещество и подлежащий предметно-количественному учету, в соответствии с пунктом II приложения к приказу Минздрава России от 22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету";

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ЛП по коду АТХ - лекарственные препараты, относящиеся по АТХ к антипсихотическим средствам (код N05A), анксиолитикам (код N05B), снотворным и седативным средствам (код N05C), антидепрессантам (код N06A) и не подлежащие предметно-количественному учету, рецепты на которые остаются в аптечной организации и хранятся в течение трех месяцев в соответствии с пунктом 14 Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, утвержденную приказом Минздрава России от 11.07.2017 № 403н.

ФТГ - фармако-терапевтическая группа

"+" в соответствии с приказом Минздрава России от 22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету";

"++" в соответствии с Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9.06.2010 № 419

*режим дозирования врач выбирает самостоятельно в зависимости от характера и тяжести заболевания